

121030_BSN_Tuerposter_600x800.indd 1













• stabil •





1 Laterale Schenkelhalsfraktur

2 Mediale Schenkelhalsfraktur











• instabil •

► Pertrochantäre Femurfraktur



• äußerst instabil •


► Subtrochantäre Femurfraktur






Subtrochantärer

► Femurschaftfraktur







▶ Distale Femurfraktur









Diakondyläre Fraktur

des Gelenkes

Kniescheibe













Unterschenkel


► Tibiakopffraktur







monokondylär













Biegungskeil







Einfache Fraktur

► Tibiastauchungsfraktur (Pilon-Tribialfraktur)

Gelenkstufe

Kompressionstrümmerfraktur





► Malleolarfraktur



Typ A: Fibulafraktur

distal der Syndes-


mose mit/ohne

Innenknöchelfraktur



Höhe der Syndes-


Innenbandruptur



Fraktur proximal

der Syndesmose





Typ D:

Syndesmosenruptur bei

hoher Fibulafraktur

(Maisonneuve-Fraktur)





Kantenfragment

dreieck, Riss des vorderen Bandes

Fuß

121030_BSN_Tuerposter_600x800.indd 2

▶ Talusfraktur














▶ Phalanxfraktur



Abrissfraktur









Dynacast® Prelude | Delta-Cast® Conformable | Delta-Cast® Elite | Delta-Cast® Prints | Delta-Cast® Soft | Delta-Lite® Conformable | Delta-Lite® Plus

Kompressionsfraktur Tubergelenkwinkel abgeflacht bis aufgehoben